

RATIMOR[®]

brodifakum[®]

PARAFÍNOVÉ BLOKY

PRVÁ POMOC: Tento výrobok obsahuje antikoagulantnú látku. Pri prehltnutí symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným účinkom, zahŕňajú krvácanie z nosa a krvácajúce ďasná. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči. Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/veterinárnym personálom. V prípade: dermálnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydlom; zasiahnutia očí vypláchnite oči tekutinou na výplach očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút; orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou, nikdy nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí. Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Ak výrobok prehltnú domáce zvieratá, spojte sa s veterinárnym lekárom. Deratizačné stanice musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“, „obsahuje rodenticíd“, „názov výrobku alebo číslo autorizácie“, „účinné látky“ a „v prípade nehody zavolajte do toxikologického centra [tel: 00421 2 54 77 41 66]“. Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá.

Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticídy účinné 4 až 10 dní po požití návnady. Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte. Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo.

NÁVOD NA BEZPEČNÉ ZNEŠKODNENIE VÝROBKU A JEHO OBALU: Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami. Tento materiál a jeho obal sa musí zlikvidovať bezpečne. Balenie, zvyšky nepoužitej návnady a mŕtve hlodavce zlikvidujte podľa miestnych predpisov. Ak je potrebné, poraďte sa s profesionálnym odpadovým operátorom alebo miestnym úradom. Odporúča sa používanie rukavíc.

SKLADOVANIE: Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia. Uchovávajte na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat. Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do kontaktu.

Môže spôsobiť poškodenie orgánov (krvi) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Nevdychujte prach. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite nádobu a nepoužitú návnadu ako nebezpečný odpad v súlade s miestnymi nariadeniami.

Účinná látka: Brodifakum 0.0029 % (CAS No.: 56073-10-0)

Číslo autorizácie: SK16-MRS-003

Obsah: 300g

Dátum výroby, dátum spotreby a číslo šarže: na obale.

POZOR



Dovozca:
UNICHEM Slovakia s.r.o.,
Domové role 70/B, 82105 Bratislava,
Tel.: + 421 911 221 311

02 07 20
02 07 22 /41233

UNICHEM

Výrobca a držiteľ registrácie:
UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika,
Slovinsko, Tel.: +386 1 7558 152,
unichem@unichem.si, www.unichem.si